

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA DE DOCTORADO

TESIS DOCTORALES

TÍTULO: UTILIDAD DE ELTROMBOPAG EN PACIENTES ADULTOS AFECTOS DE TROMBOCITOPENIA INMUNE (PTI) EN ESPAÑA. EFICACIA Y SEGURIDAD DEL FÁRMACO. POSIBLES ALTERNATIVAS DE USO.

AUTOR: GONZÁLEZ LÓPEZ, TOMÁS JOSÉ.

PROGRAMA DE DOCTORADO: AVANCES EN CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIAS

FECHA LECTURA: 29/10/2019

HORA: 12:00

CENTRO LECTURA: SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. (UNIVERSIDAD DE BURGOS).

DIRECTORES: GERMÁN MANUEL PERDOMO HERNÁNDEZ
LUIS JAVIER GARCÍA FRADE

TRIBUNAL: ANTONIO DUEÑAS LAITA
DIEGO SERRANO GÓMEZ
ISIDRO JARQUE RAMOS
DAVID BERNARDO ORDIZ
PILAR DE VICENTE CÁMARA

RESUMEN: La trombocitopenia inmune primaria ó PTI es un desorden autoinmune de naturaleza adquirida que cursa con cifras bajas de plaquetas y eventuales hemorragias. El mecanismo fundamental y “clásico” por el cual se produce esta enfermedad es una destrucción plaquetar mediada por autoanticuerpos. Sin embargo, recientemente se ha objetivado una producción plaquetar ineficiente a nivel medular.

Los agonistas del receptor de la trombopoyetina (TPO-RAs) al unirse a la trombopoyetina estimulan la megacariopoyesis en PTI. Eltrombopag es un TPO-RA indicado en PTI primaria de 6 meses o más de duración desde el diagnóstico y refractaria a otros tratamientos.

Nuestro trabajo demuestra elevada eficacia y seguridad del fármaco en la práctica clínica diaria en PTI primaria y secundaria de pacientes adultos. Consideramos como alternativas de uso útiles el empleo de eltrombopag en pacientes mayores, su potencial discontinuación exitosa tras un tratamiento de corta-moderada duración y su utilización tras el fallo de otro TPO-RA.

Palabras clave en español: Trombocitopenia inmune primaria (PTI), Eltrombopag, Primaria, Secundaria, Discontinuación

Keywords: Immune thrombocytopenia, Eltrombopag, Primary, Secondary, Discontinuation